

流感疫苗大哉問 
打或不打！？
還真是個問題

Q. 流感跟一般感冒的差異在哪裡？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前

流感

全身性症狀
病程長 (約1-2周)

常見症狀：

- 發燒 (3-4天)
- 喉嚨痛
- 肺炎、支氣管炎
- 肌肉痠痛



感冒

呼吸道局部性症狀
病程短 (約2-5天)

常見症狀：

- 少發燒 (僅體溫微高)
- 喉嚨痛
- 鼻涕、鼻塞



流感的症狀比一般感冒嚴重，且傳播力強，高危險族群則可能會出現嚴重併發症（肺炎、腦炎、心肌炎等）甚至死亡。

Q. 該怎麼做才能有效對抗流感？



儘早接種流感疫苗



保持肥皂勤洗手、咳嗽
戴口罩等生活好習慣

警覺流感症狀，有
危險徵兆儘快就醫



生病按時服藥多休息，
不上班不上課

Q. 為什麼一定要接種流感疫苗？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前

接種流感疫苗可以.....



增強抵抗力



降低流感併發重症
或死亡的機率



保護其他無法或
不適合接種的人

1918年西班牙流感襲捲歐美，造成數千萬人死亡，超過第一次世界大戰的傷亡人數(〒▽〒)




Q. 流感疫苗安全嗎？是怎麼採購的呢？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前

流感疫苗哪裡來？



流感疫苗廠商皆依循世界衛生組織每年公布的疫苗選株來製造疫苗。



政府每年採購的流感疫苗（不論進口或國內製造），都要經過主管機關食藥署批准後才可提供民眾接種。



Q. 哪些人不適合接種流感疫苗？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前



對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者



正在發燒
或急性疾病患者



疫苗成份過敏者
已知對疫苗成份有過敏請勿接種



過去注射曾發生
嚴重不良反應者




6個月以下嬰兒
因為接種後的免疫反應不佳，故不建議接種

其他特殊情況，經醫師評估不適合接種者

Q. 為什麼每年都要接種 流感疫苗？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前



容易產生變異

每年流行的病毒株稍有不同


此外，接種流感疫苗4-6個月後保護效果即開始下降，因此建議每年均須接種1次；若年初已經接種，仍建議同年10月流感季來臨前再次接種新的疫苗。

Q. 接種流感疫苗的保護效果如何？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前

— 流感疫苗保護力 —



Q. 打了流感疫苗後發燒
= 感染到流感？



疾病管制署 - 1922防疫達人

流感疫苗是不活化疫苗，
接種後不會感染流感喔！




48小時內有發燒反應：
請就醫並告知醫師曾經接種過流感
疫苗，作為診斷參考。

48小時後仍持續發燒：
請思考是否另有其他感染或引起發
燒的原因，並儘快就醫治療。

Q. 因為有群體免疫，所以我不打也沒關係？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前



還是建議要接種流感疫苗，尤其是流感高危險族群！
因為群體免疫需要時間累積，須群體接種率到一定程度
才會產生足以減緩流感傳播的間接保護，所以建議還是
接種疫苗獲得直接保護較佳。

Q. 接種流感疫苗後要注意什麼？



疾病管制署
發布於 5 分鐘前



原地休息30分鐘

接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。



觀察注射處有無異狀



注意有無異常症狀

接種後應注意有無持續發燒、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，有以上症狀應儘速就醫。

完成疫苗接種後，仍可能罹患其他呼吸道感染症，平時是要注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。



注意個人衛生保健